


COVID-19 BIOLÓGIAI TERÁPIA



IL-6 Receptor Antagonista:

- ▶ Tocilizumab 400 mg x1 IV
- ▶ Sarilumab 200 mg x1 IV

A dózist ismételheted, ha 8-12 órával később a beteg nem láztalan, vagy 24-48 órával később a gyulladási markerek gyorsan romlanak.

Anakinra:

- ▶ 200 mg IV vagy SC 6-12 óránként 72 órán keresztül
- ▶ preferált út: SC

CrCl < 30 ml/min vagy HD:

- ▶ 100 mg IV/12h

- Folyamatosan figyeld:**
1. Életfunkciók
 2. Folyamatos pulzoximetria
 3. CRP naponta
 4. Ferritin naponta
 5. LDH naponta
 6. Fibrinogen naponta
 7. Vérkép naponta
 8. Májfunkció naponta
 9. We/CRP

NB!

- ▶ PCT inkább infekció jele.
- ▶ We CSS-ben alacsony lesz.
- ▶ Ferritin/We > 200: CSS jele

Cheat-sheet:

	IL-6:	D-dimer (DD):
"Enyhe" COVID	10 pg/ml	200 ng/l
"Súlyos" COVID:	35 pg/ml	500 ng/l
Optimal treshold:	25 pg/ml	280 ng/l

NB! A trend fontosabb mint az aktuális érték!

© Dr. Constantin Tamás
Irodalom: Immunológiai Szemle, 2020/1 és Boston Medical Center

Felhasználási feltételek:
egyéni mérlegelés, személyes orvosi döntés alól nem mentesít.

Ha bakteriális infekció és/vagy ARDS társul a CSS-hez, akkor fontold meg az anakinra kezelést!